

centrum prenatální diagnostiky

genetická poradna • gynekologická ambulance • laboratoř molekulární genetiky

SCREENING PREEKLAMPSIE

Provádíme mezi **11. – 14. týdnem gravidity** pomocí následujících markerů: **Doppler uterinních cév (certifikace FMF), PIGF, PAPP A, vyšetření krevního tlaku a cílené anamnézy.**

Výpočet **rizika preeklampsie (PE)** je součástí prvotrimestrálního screeningu.

„Citlivost“ testu je cca 70%.

Preeklampsie (PE) postihuje přibližně 3 % všech těhotenství. Projevuje se ve třetím trimestru zvyšováním krevního tlaku, vylučováním bílkoviny do moči a tvorbou otoků.

Sídlo společnosti:
Hanáckého pluku 6
770 00 Olomouc

Tel.: +420 585 242 733
Mobil: +420 603 887 567

E-mail: info@usgpol.cz
www.usgpol.cz



U.S.G.POL s.r.o.



SCREENING PREEKLAMPSIE

PE přímo souvisí s rizikem ohrožení života matky či plodu. Jde o jednu z hlavních příčin předčasného porodu nezralého novorozence.

Této závažné komplikaci lze předejít nasazením Anopyrinu od prvního trimestru těhotenství.

Výpočet rizika PE není hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Cena testu je 1200,-Kč.

